

Wakati wa Kumweka Mtoto Wako Nyumbani bila kwenda Shuleni au Sehemu ya Kuwatunza Watoto

Yafuatayo ni mapendekezo ya wakati wa kumweka mtoto wako nyumbani ikiwa hahisi vizuri. Wasiliana na mhudumu wa afya ikiwa mtoto wako anahitaji huduma ya matibabu. Barua kutoka kwa daktari kawaida haihitajiki ili kurudi shuleni au eneo la kuwatunza watoto. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tembelea [ukurasa wa mwongozo wa CDPH](#).



Dalili za Ugonjwa

Mtoto wangu anapaswa kukaa nyumbani wakati gani na anaweza kurudi wakati gani?

Kwa jumla, hahisi vizuri

KA NYUMBANI IWAPO ugonjwa au dalili yoyote mpya itamzuia mtoto kushiriki ipasavyo katika shughuli za kawaida.



Homa

KA NYUMBANI IWAPO a joto kali limefika 100.4°F (38°C) au zaidi.

RUDI IWAPO homa ilipungua usiku na kuisha kufikia asubuhi bila kutumia dawa kama vile Tylenol®, Advil®, au Motrin® (acetaminophen au ibuprofen).



Kutapika

KA NYUMBANI IWAPO ametapika mara 2 au zaidi ndani ya saa 24.

RUDI WAKATI AMBAPO mtoto ameacha kutapika baada ya siku moja, na anaweza kushikilia majimaji na chakula. Pendekeza kunawa mikono kila mara.



Kuhara

KA NYUMBANI IWAPO kinyesi cha mtoto wako kinaweza kuvuja kutoka kwa nepi, au ikiwa hawana uwezekano wa kufika chooni kwa wakati (ikiwa wamejua kutumia choo). Ikiwa kinyesi kinaonekana kuwa na damu au cheusi, tafuta matibabu.

RUDI IWAPO unapata nafuu. Pendekeza kunawa mikono kila mara.



Tambaza msimbo wa QR ili kupata toleo la hivi karibuni zaidi la flaya hii.



Wakati wa Kumweka Mtoto Wako Nyumbani bila kwenda Shuleni au Sehemu ya Kuwatunza Watoto



Vidonda vya koo

Mtoto wangu anapaswa kukaa nyumbani wakati gani na anaweza kurudi wakati gani?

NI SAWA KUHUDHURIA UKIWA NA DALILI KIASI.

Tafadhali zingatia kuvaa barakoa ikiwa una umri wa miaka 2 au zaidi.

KAA NYUMBANI NA UTAFAUTE MATIBABU ya matatizo ya kupumua au kumeza, au kukojoa mara kwa mara.

RUDI IWAPO UNAPATA NAFUU. Ikiwa umeagizwa kutumia kiua viini, tumia dozi ya kwanza angalau saa 12 kabla ya kurudi.



Dalili za baridi, kama kikohozi, pua iliyobanwa/kudon dokwa makamasi, kupiga chafya

NI SAWA KUHUDHURIA UKIWA NA DALILI KIASI.

Tafadhali zingatia kuvaa barakoa ikiwa una umri wa miaka 2 au zaidi.

KAA NYUMBANI NA UTAFAUTE MATIBABU ya dalili kali, ikiwa ni pamoja na kikohozi kibaya, ugumu wa kupumua au kushindwa kupumua, au kupumua bila kudhibitiwa na dawa (kama albuterol).

RUDI IWAPO UNAPATA NAFUU. Ikiwa mtoto wako atahitaji dawa baada ya kurudi, wasiliana na eneo ili kuwafahamisha.



Muwasho wa sikio au macho, ikiwa pamoja na jicho la pinki

NI SAWA KUHUDHURIA UKIWA NA DALILI KIASI.

Pendekeza kunawa mikono kila mara.

KAA NYUMBANI NA UTAFAUTE MATIBABU ya shida ya kuona au kusikia, jeraha la jicho, au maumivu ambayo hawawezi kuvumilia.



Upele

NI SAWA KUHUDHURIA UKIWA NA DALILI KIASI.

KAA NYUMBANI NA UTAFAUTE MATIBABU

ikiwa upele unaongezeka, na kusababisha maumivu, una malengengele, au hauponi.

RUDI IWAPO UNAPATA NAFUU au ilivyoagizwa na mhudumu wa afya. Kwa ujumla, kwa hali kama vile chawa, upele ambukizi wa malengengele, wadudu, upele na minyoo, mtoto wako anaweza kurudi mara tu atakapoanza matibabu yanayofaa.